

Über die Coleopteren-Gattung: *Leucolaephus* Lucas der unechten Pimeliiden.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Man hat bisher den *L. Perrisi* Fairm. als ♀ zum *nigropunctatus* Luc. gezogen. Ein eingehenderes Studium der Arten nach den Originalbeschreibungen läßt aber sicher erkennen, daß obige Art mit (*Pimelia*) *liliputana* Luc. zusammenfällt. Auf die denudierte Streifung der Flügeldecken wurde bisher zu wenig Gewicht gelegt. Die Zähnelung der Vorderschienen am Außenrande variiert von 4—6 Zähnen; gewöhnlich hat das ♂ einen Zahn weniger als das ♀.

Es sind bisher 4 Arten bekannt, wovon ich 3 kenne, welche sämtlich aus Nordafrika: Algier, Tunis, Tripolis stammen. Die 4. Art: *L. latifrons* Fairm. (Ann. 1883, p. 97) ist in Abessinien einheimisch.

Die 3 nordafrikanischen sehr ähnlichen, oben weiß beschuppten Arten, lassen sich leicht in nachfolgender Weise unterscheiden:

1'' Flügeldecken mit feinen denudierten Streifen und mit schwarzen Kahlpunkten.

L. Perrisi Fairm.

Algier: Tougourt.

liliputanus Luc.

1' Flügeldecken ohne Streifen, oben gleichmäßig beschuppt und mit Kahlpunkten.

2'' Die Schüppchen der Oberseite sind rund, nicht länger als breit, die Härchen in den Kahlpunkten roströtlich, länger als bei der nächsten Art. Kopf beträchtlich schmaler als der Halsschild. Algier.

nigropunctatus Luc.

2' Die Schüppchen der Oberseite sehr klein, länglich, viel länger als breit, die Härchen in den Kahlpunkten sehr kurz, schwarz. Kopf samt den Augen sehr wenig schmaler als der Halsschild. Kleinste Art.

Tripolis.

tripolitanus Quedenf.